

hCK-Pan-mAb (C11)

Anti-Human Pancytokeratin Monoclonal Antibody clone C11

抗ヒトPanサイトケラチンモノクローナル抗体 (C11)

サイトケラチンは、主に上皮細胞で発現される中間径フィラメントタンパク質です。酸性ケラチン(または I型ケラチン:CK9-23)と塩基性ケラチン(または II型ケラチン:CK1-8)から成るケラチンヘテロダイマーは、フィラメントを形成するために組み合わさります。ケラチンのアイソフォームは、組織や分化特異的なプロファイルを示す有効なバイオマーカーです。ケラチン遺伝子の変異は、皮膚障害、肝臓および膵疾患、炎症性腸疾患に関連すると報告されています。


本抗体は、ヒト上皮細胞株A431をマウスに免疫後、マウスの脾臓細胞とマウスミエロマ細胞を融合して得られたハイブリドーマを無血清培養し、培養上清からProteinGによりアフィニティ精製したものです。ヒトCK4, 5, 6, 8, 10, 13, 18 (通称:Pancytokeratin)と反応します。

製品名	製品番号	サイズ	価格 (税込)
Anti-Human Pancytokeratin Monoclonal Antibody clone C11	47008000	100 µg	¥55,000

※本製品はライセンス契約に基づき弊社が製造・販売するものです。
※バルク注文については営業所、ホームページまでお問い合わせ下さい。
※本品は研究用試薬であり、医薬品では御座いません。

製品仕様

サブクラス	マウスIgG ₁
交差性	ヒトのみ確認しております
製品形態	精製抗体/PBS(-)溶液
保存条件	冷凍 (-70℃以下)
濃度	0.8-1.2 mg/mL (Abs. 280 nm換算)
純度	≥ 90% (SDS-PAGE)
品質規格	IHC及びWBで反応性を確認しています。
容量	100 µg



H: Hela Cell lysate
M: MCF7 Cell lysate

※本製品はロット毎に製品仕様項目を品質確認済みです。




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Fig.1 正常腎組織(パラフィン切片)染色像:
一部の尿細管のみが染色され、血管(B)、糸球体(G)や周辺の脂肪細胞等への非特異的な染色はない。染色された尿細管が近位か遠位に特異的であるか形状から判別できなかった。

Fig.2 乳癌組織(パラフィン切片)染色像:
浸潤する上皮性癌細胞は、あまり染色されなかった。脂肪細胞(A)等の周辺細胞の非特異的な染色はない。

Fig.3 大腸癌組織(パラフィン切片)染色像:
正常な上皮細胞も浸潤する上皮性癌細胞もあまり強く染色されない。周辺の間質細胞には非特異的な染色はない。

(写真提供:市立奈良病院 病理部 今井俊介先生)

参考文献

1. Karstein et al., *Eur. J. Cancer Clin. Oncol.* **21**, 733 (1985).
2. Kasper et al., *Eur. J. Cancer Clin. Oncol.* **25**, 137 (1987).
3. Kerstein et al., *Differentiation* **40**, 207 (1989).

お客様窓口

お問い合わせやご注文は下記からお願いいたします。

Webサイト: <https://www.oyc.co.jp/bio/>

製品に関するお問い合わせ: バイオ事業本部
Tel 03-3968-1192
Fax 03-3968-4863

Webサイトは
こちらから!



営業部及び販売会社

東日本バイオ営業部	Tel 03-3968-1163	Fax 03-3968-1196
東日本バイオ営業部 札幌支所	Tel 011-261-6591	Fax 011-222-0755
東日本バイオ営業部 つくば支所	Tel 029-858-0115	Fax 029-858-2931
西日本バイオ営業部	Tel 06-6338-1095	Fax 06-6384-7692
(株)オリエンタルバイオサービス	Tel 075-322-1177	Fax 075-322-0232
(株)ケービーティーオリエンタル	Tel 0942-81-2400	Fax 0942-81-2401

